

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

(11) N° de publication :
[A n'utiliser que pour
le classement et les
commandes de reproduction].

2.168.137

(21) N° d'enregistrement national
[A utiliser pour les paiements d'annuités,
les demandes de copies officielles et toutes
autres correspondances avec l'I.N.P.I.]

72.01439

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

1^{re} PUBLICATION

(22) Date de dépôt 17 janvier 1972, à 15 h 27 mn.
(41) Date de la mise à la disposition du
public de la demande B.O.P.I. - «Listes» n. 35 du 31-8-1973.
(51) Classification internationale (Int. Cl.) A 61 k 27/00//C 07 c 149/00;
C 07 d 5/00, 31/00, 91/00.
(71) Déposant : DYNACHIM, Société à responsabilité limitée, 16, avenue de Friedland,
75008 Paris.

(73) Titulaire : *Idem* (71)
(74) Mandataire :
(54) Dérivés des bis (hydroxy-4 phénylthio) alcanes.


(72) Invention de :

(33) (32) (31) Priorité conventionnelle :




English
Translation

The present invention relates to novel industrial products composed of esters derived from bis(4-hydroxyphenylthio)alkanes.


- 5 The compounds targeted by the invention are defined by the general formula I below:



- 10 In this formula, R' represents a light alkyl residue or a hydrogen atom;
 R'' represents a methyl or ethyl residue;
 R''' represents a tert-amyl or tert-butyl residue;
 R'''' represents a light alkyl residue;
- 15 X represents one of the residues defined by the following formulae:



(VI)



in which the N-oxide functional group is optional;

A represents a saturated or ethylenic divalent hydro-
 5 carbonaceous group comprising 1 to 18 straight- or
 branched-chain carbon atoms which can optionally carry
 a ketone oxygen atom or a hydroxyl group or a phenyl,
 alkylphenyl, aralkylphenyl, arylphenyl, acylphenyl,
 alkoxyphenyl or halophenyl residue;

10 B represents a divalent hydrocarbonaceous group
 comprising 1 to 5 carbon atoms in a straight or
 branched and saturated or ethylenic chain;

Y represents a hydrogen atom or a light alkyl residue;


Z represents one to three optional substitutions which
 15 can be one or more alkyl residues and/or one or more
 alkenyl residues and/or one or more trifluoromethyl
 residues and/or one or more cycloalkyl residues and/or
 one or more cycloalkenyl residues and/or one or more
 aryl residues and/or one or more aralkyl residues
 20 and/or one or more aralkenyl residues and/or one or
 more halogens and/or one or more alkoxy groups and/or
 one or more alkylthio groups and/or one or more aryloxy
 groups and/or one or more aralkoxy groups and/or one or
 more arylthio groups and/or one or more aralkylthio
 25 groups;

R can also represent a divalent hydrocarbonaceous group
-CH=CH-CH=CH- which joins two vicinal carbon atoms of
the benzene nucleus so as to form a naphthalene, which
can itself carry one or two substitutions listed above
5 and, when one of these substitutions is a cyclohexyl or
cyclohexenyl residue, the latter can carry a hydroxyl
or oxo functional group and/or an alkyl or alkenyl
residue.

10 The compounds of the invention have pharmacodynamic,
hypocholesterolemic and hypolipidemic properties.

The invention is also targeted at the processes for the
manufacture of the compounds defined by the above
15 general formula.

These processes consist of the action of the halide or
anhydride of an acid of general formula X-COOH on a
bis(4-hydroxyphenylthio)alkane of following general
20 formula VII



in which R', R'', R''' and R'''' are as were specified
25 previously.

The reaction is preferably carried out in an inert liquid which acts as solvent or vehicle, such as, for example, a hydrocarbon, an ether, an oxygenated heterocycle, an N,N-dialkylamide or their mixtures; the
5 reaction is preferably carried out at a temperature greater than ambient temperature, such as, for example, that of the reflux of the solvent or vehicle used.

The reaction is preferably carried out in the presence
10 of a base intended to fix the hydrohalic acid displaced in the reaction, it being possible for said base to be, for example, an alkaline hydroxide or carbonate, a tertiary amine or a tertiary nitrogenous heterocycle, it being possible for the latter to act partially or
15 completely as solvent for the reactants present. Use may also be made of an O-metallic derivative, isolated beforehand, of the bis(4-hydroxyphenylthio)alkane.

Example 1

20 2,2-Bis[4-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropionyloxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

268 grams (0.5 mol) of 2,2-bis(3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxyphenylthio)propane and 101 grams (1 mol) of
25 triethylamine are introduced into 4 liters of dry benzene; 216 grams (1 mol) of 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropionyl chloride are slowly added; the mixture is stirred for 30 minutes and gradually brought to

reflux, which reflux is maintained for 30 minutes; the mixture is filtered, without cooling, to remove the triethylamine hydrochloride and then the benzene is evaporated under reduced pressure; the residue is washed with a small amount of pentane and dried under vacuum.

Example 2

10 By replacing 2,2-bis[3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxyphenylthio]propane with an equimolecular amount of another bis(4-hydroxyphenylthio)alkane in accordance with the formula III in the reaction of Example 1, it is possible in particular to obtain the following
15 compounds:

1,1-Bis[4-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropionyloxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

1,1-Bis[4-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropionyloxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]ethane

20 2,2-Bis[4-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropionyloxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]butane

2,2-Bis[4-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropionyloxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]hexane

2,2-Bis[4-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropionyloxy]-3,5-di(tert-amyl)phenylthio]propane

25 2,2-Bis[4-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropionyloxy]-3-methyl-5-(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropiony]-3-isopropyl-5-(tert-butyl)phenylthio]propane

1,1-Bis[4-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropiony]-3-isopropyl-5-(tert-butyl)phenylthio]ethane

5 2,2-Bis[4-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropiony]-3-isopropyl-5-(tert-butyl)phenylthio]pentane

Example 3

10 By replacing 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropionyl chloride in the reaction of Example 1 with an equimolecular amount of another chloride X-CO-Cl in accordance with the formula II, it is possible in particular to obtain the following compounds:

15 2,2-Bis[4-[2-(4-chlorophenoxy)acetoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[(4-chlorophenoxy)propiony]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropiony]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[2-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)-propiony]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[2-(2,4-dichlorophenoxy)-2-methylpropiony]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

25 2,2-Bis[4-[2-(4-methylphenoxy)-2-methylpropiony]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[2-(4-chlorophenoxy)butyroxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

- 2,2-Bis[4-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methylbutyroxyl]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[2-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)butyroxyl]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 5 2,2-Bis[4-[2-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)-butyroxyl]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[4-methyl-4-phenoxyvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[4-ethyl-4-phenoxyvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 10 2,2-Bis[4-[2,4-dimethyl-4-phenoxyvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[2,4-dimethyl-4-phenoxy-2-pentenoyloxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 15 2,2-Bis[4-[4-(4-chlorophenoxy)-4-methylvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[4-(4-chlorophenoxy)-2,4-dimethylvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 20 2,2-Bis[4-[4-(4-chlorophenoxy)-2,4-dimethyl-2-pentenoyloxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[4-(4-chloro-2-methylphenoxy)-2,4-dimethylvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[4-(4-chlorophenoxy)butyroxyl]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 25 2,2-Bis[4-[4-(4-chlorophenoxy)-3-hydroxy-4-methylvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

- 2,2-Bis[4-[4-(4-chlorophenoxy)-3-oxo-4-methylvalerian-
oxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[4-(4-chlorophenoxy)-3-hydroxy-2,4-dimethyl-
valerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 5 2,2-Bis[4-[4-(4-chlorophenoxy)-3-oxo-2,4-dimethyl-
valerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[4-(4-chlorophenoxy)-3-hydroxy-2-methyl-
valerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[4-(2,4-dichlorophenoxy)-3-hydroxy-4-methyl-
10 valerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[4-(2,4-dichlorophenoxy)-3-oxo-4-methyl-
valerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[4-(2,4-dichlorophenoxy)-3-hydroxy-2-methyl-
valerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 15 2,2-Bis[4-[4-(2,4-dichlorophenoxy)-3-oxo-2-methyl-
valerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[4-(2,4-dichlorophenoxy)-3-hydroxy-2,4-di-
methylvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[4-(2,4-dichlorophenoxy)-3-oxo-2,4-dimethyl-
20 valerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[4-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)-3-hydroxy-4-
methylvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[4-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)-3-hydroxy-2-
methylvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 25 2,2-Bis[4-[4-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)-3-oxo-4-
methylvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[4-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)-3-oxo-2-
methylvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

- 2,2-Bis[4-[4-(2,4-dimethylphenoxy)-3-hydroxy-4-methyl-
valerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[4-(2,4-dimethylphenoxy)-3-oxo-4-methyl-
valerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 5 2,2-Bis[4-[4-(2,4-dimethylphenoxy)-3-hydroxy-2-methyl-
valerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[4-(2,4-dimethylphenoxy)-3-oxo-2-methyl-
valerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-4-chlorophenoxy)-3-hydroxy-4-
10 methylvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-4-chlorophenoxy)-3-hydroxy-2-
methylvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-4-chlorophenoxy)-3-oxo-4-methyl-
valerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 15 2,2-Bis[4-[4-(2-methyl-4-chlorophenoxy)-3-oxo-2-methyl-
valerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[α -(2-methyl-4-chlorophenoxy)- α -(4-chloro-
phenyl)acetoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[α -(2-methyl-4-chlorophenoxy)- α -(4-(tri-
20 fluoromethyl)phenyl)acetoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenyl-
thio]propane
- 2,2-Bis[4-[α -(2,4-dichlorophenoxy)- α -(4-chlorophenyl)-
acetoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[α -(2,4-dimethylphenoxy)- α -(4-chlorophenyl)-
25 acetoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[α -(4-chlorophenoxy)- α -(4-chlorophenyl)-
acetoxy]3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

- 2,2-Bis[4-[α -(2,4-dimethylphenoxy)- α -(4-chlorophenyl)-
acetoxyl-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[α -(4-(trifluoromethyl)phenoxy)- α -(4-chloro-
phenyl)acetoxyl-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 5 2,2-Bis[4-[α -(2-methyl-4-(trifluoromethyl)phenoxy)- α -
(4-chlorophenyl)acetoxyl-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]-
propane
- 2,2-Bis[4-[2-(6-cyclohexyl-2-naphthyl)oxy-2-methyl-
propionoxyl-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 10 2,2-Bis[2-[6-(3-hydroxycyclohexyl)-2-naphthyl]oxy-2-
methylpropionoxyl-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[2-[6-(3-hydroxy-3-methylcyclohexyl)-2-
naphthyl]oxy-2-methylpropionoxyl-3,5-di(tert-butyl)-
phenylthio]propane
- 15 2,2-Bis[4-[2-[6-(3-hydroxy-1-cyclohexenyl)-2-
naphthyl]oxy-2-methylpropionoxyl-3,5-di(tert-
butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[2-[6-(3-hydroxy-3-ethylcyclohexyl)-2-
naphthyl]oxy-2-methylpropionoxyl-3,5-di(tert-butyl)-
phenylthio]propane
- 20 2,2-Bis[4-[2-[6-(3-hydroxy-3-vinylcyclohexyl)-2-
naphthyl]oxy-2-methylpropionoxyl-3,5-di(tert-butyl)-
phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-(6-cyclohexyl-2-naphthyl)oxyacetoxyl-3,5-
di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 25 2,2-Bis[4-[[6-(3-oxocyclohexyl)-2-naphthyl]oxyacetoxyl-
3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[2-[6-(3-oxocyclohexyl)-2-naphthyl]oxy-2-methylpropionoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[[6-(3-oxo-1-cyclohexenyl)-2-naphthyl]oxy-acetoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

- 5 2,2-Bis[4-[2-[6-(3-oxo-1-cyclohexenyl)-2-naphthyl]oxy-2-methylpropionoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

Example 4

- 10 2,2-Bis(4-nicotinoyloxy-3,5-di(tert-butyl)phenylthio)propane

268 grams (0.5 mol) of 2,2-bis(3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxyphenylthio)propane and 101 grams (1 mol) of
15 triethylamine are introduced into 4 liters of dry benzene; 142 grams (1 mol) of nicotinoyl chloride are gradually added; the mixture is stirred for 30 minutes and then gradually brought to reflux, which reflux is maintained for 30 minutes; the mixture is filtered,
20 without cooling, to remove the triethylamine hydrochloride and then the benzene is evaporated under reduced pressure; the residue is washed with a small amount of pentane and dried under vacuum.

25

Example 5

By replacing 2,2-bis(3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxyphenylthio)propane with an equimolecular amount of

another bis(4-hydroxyphenylthio)alkane in accordance with the formula VIII in the reaction of Example 4, it is possible in particular to obtain the following compounds:

- 5 1,1-Bis(4-nicotinoyloxy-3,5-di(tert-butyl)phenylthio)-
propane
1,1-Bis(4-nicotinoyloxy-3,5-di(tert-butyl)phenylthio)-
ethane
2,2-Bis(4-nicotinoyloxy-3,5-di(tert-butyl)phenylthio)-
10 butane
2,2-Bis(4-nicotinoyloxy-3,5-di(tert-butyl)phenylthio)-
hexane
2,2-Bis(4-nicotinoyloxy-3,5-di(tert-amyl)phenylthio)-
propane
15 2,2-Bis(4-nicotinoyloxy-3-methyl-5-(tert-butyl)phenyl-
thio)propane
2,2-Bis(4-nicotinoyloxy-3-isopropyl-5-(tert-butyl)-
phenylthio)propane
1,1-Bis(4-nicotinoyloxy-3-isopropyl-5-(tert-butyl)-
20 phenylthio)ethane
2,2-Bis(4-nicotinoyloxy-3-isopropyl-5-(tert-butyl)-
phenylthio)pentane

Example 6

25

By replacing nicotinoyl chloride with an equimolecular amount of an N-oxide of nicotinoyl chloride in

Examples 4 and 5, it is possible in particular to obtain the following compounds:

- 2,2-Bis(4-(N-oxynicotinoyloxy)-3,5-di(tert-butyl)phenylthio)propane
- 5 1,1-Bis(4-(N-oxynicotinoyloxy)-3,5-di(tert-butyl)phenylthio)propane
- 1,1-Bis(4-(N-oxynicotinoyloxy)-3,5-di(tert-butyl)phenylthio)ethane
- 2,2-Bis(4-(N-oxynicotinoyloxy)-3,5-di(tert-
- 10 butyl)phenylthio)butane
- 2,2-Bis(4-(N-oxynicotinoyloxy)-3,5-di(tert-butyl)phenylthio)hexane
- 2,2-Bis(4-(N-oxynicotinoyloxy)-3,5-di(tert-amyl)phenylthio)propane
- 15 2,2-Bis(4-(N-oxynicotinoyloxy)-3-methyl-5-(tert-butyl)-phenylthio)propane
- 2,2-Bis(4-(N-oxynicotinoyloxy)-3-isopropyl-5-(tert-butyl)phenylthio)propane
- 1,1-Bis(4-(N-oxynicotinoyloxy)-3-isopropyl-5-(tert-
- 20 butyl)phenylthio)ethane
- 2,2-Bis(4-(N-oxynicotinoyloxy)-3-isopropyl-5-(tert-butyl)phenylthio)pentane

Example 7

- 25 2,2-Bis[4-(5-thiazolylcarbonyloxy)-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

268 grams (0.5 mol) of 2,2-bis(3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxyphenylthio)propane and 101 grams (1 mol) of triethylamine are introduced into 4 liters of dry benzene; 148 grams (1 mol) of 5-thiazolecarbonyl chloride are gradually added; the mixture is stirred for 30 minutes and then gradually brought to reflux, which reflux is maintained for 30 minutes; the mixture is filtered, without cooling, in order to remove the triethylamine hydrochloride and then the benzene is evaporated under reduced pressure; the residue is washed with a small amount of pentane and dried under vacuum.

Example 8

15

By replacing 2,2-bis(3,5-di(tertbutyl)-4-hydroxyphenylthio)propane with an equimolecular amount of another bis(4-hydroxyphenylthio)alkane in accordance with the formula VII in the reaction of Example 7, it is possible in particular to obtain the following compounds:

1,1-Bis[4-(5-thiazolylylcarbonyloxy)-3,5-di(tert-butyl)-phenylthio]propane

1,1-Bis[4-(5-thiazolylylcarbonyloxy)-3,5-di(tert-butyl)-phenylthio]ethane

2,2-Bis[4-(5-thiazolylylcarbonyloxy)-3,5-di(tert-butyl)-phenylthio]butane

2,2-Bis[4-(5-thiazolylcarbonyloxy)-3,5-di(tert-butyl)-phenylthio]hexane

2,2-Bis[4-(5-thiazolylcarbonyloxy)-3,5-di(tert-amyl)-phenylthio]propane

5 2,2-Bis[4-(5-thiazolylcarbonyloxy)-3-methyl-5-(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-(5-thiazolylcarbonyloxy)-3-isopropyl-5-(tert-butyl)phenylthio]propane

10 1,1-Bis[4-(5-thiazolylcarbonyloxy)-3-isopropyl-5-(tert-butyl)phenylthio]ethane

2,2-Bis[4-(5-thiazolylcarbonyloxy)-3-isopropyl-5-(tert-butyl)phenylthio]pentane

Example 9

15 2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxy-2-methylpropionyloxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

268 grams (0.5 mol) of 2,2-bis(3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxyphenylthio)propane and 101 grams (1 mol) of dry
20 ethylamine are introduced into 4 liters of dry benzene;
253 grams (1 mol) of 2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxy-2-methylpropionyl chloride are gradually added; the
mixture is stirred for 30 minutes and then gradually
brought to reflux, which reflux is maintained for 30
25 minutes; the mixture is filtered, without cooling, in
order to remove the triethylamine hydrochloride and
then the benzene is evaporated under reduced pressure;

the residue is washed with a small amount of pentane and dried under vacuum.

Example 10

5

By replacing 2,2-bis(3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxyphenylthio)propane with an equimolecular amount of another bis(4-hydroxyphenylthio)alkane in accordance with the formula VII in the reaction of Example 9, it is possible in particular to obtain the following compounds:

- 1,1-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxy-2-methylpropionoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 1,1-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxy-2-methylpropionoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]ethane
- 15 2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxy-2-methylpropionoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]butane
- 2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxy-2-methylpropionoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]hexane
- 20 2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxy-2-methylpropionoxy]-3,5-di(tert-amyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxy-2-methylpropionoxy]-3-methyl-5-(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxy-2-methylpropionoxy]-3-isopropyl-5-(tert-butyl)phenylthio]-
- 25 propane
- 1,1-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxy-2-methylpropionoxy]-3-isopropyl-5-(tert-butyl)phenylthio]ethane

2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxy-2-methyl-
propionyloxy]-3-isopropyl-5-(tert-butyl)phenylthio]-
pentane

5

Example 11

By replacing 2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxy-2-methylpropionyl chloride in the reaction of Example 9 with an equimolecular amount of another chloride
10 X-CO-Cl in accordance with the formula II, it is possible in particular to obtain the following compounds:

- 2,2-Bis[4-[2-(5-benzofuryl)oxyacetoxyl]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 15 2,2-Bis[4-[2-(5-benzofuryl)oxypropionyloxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[2-(5-benzofuryl)oxy-2-methylpropionyloxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[2-(5-benzofuryl)oxy-2-ethylpropionyloxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 20 2,2-Bis[4-[2-(5-benzofuryl)oxy-2-ethylbutyroxyl]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[2-(5-benzofuryl)oxy-2-methylbutyroxyl]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 25 2,2-Bis[4-[2-(5-benzofuryl)oxybutyroxyl]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[4-(5-benzofuryl)oxybutyroxyl]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

- 2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxy-2-ethyl-
propionoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxy-2-ethyl-
butyroxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
5 2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxyacetoxyl-3,5-
di(tert-butyl)phenylthio]propane
2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxypropionoxyl-3,5-
di(tert-butyl)phenylthio]propane
2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxybutyroxy]-3,5-
10 di(tert-butyl)phenylthio]propane
2,2-Bis[4-[4-(2-methyl-5-benzofuryl)oxybutyroxy]-3,5-
di(tert-butyl)phenylthio]propane
2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxyvalerianoxy]-
3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
15 2,2-Bis[4-[3-(2-methyl-5-benzofuryl)oxypropionoxyl-3,5-
di(tert-butyl)phenylthio]propane
2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxyacryloyloxy]-
3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
2,2-Bis[4-[2-(2-ethyl-5-benzofuryl)oxy-2-methyl-
20 propionoxyl-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
2,2-Bis[4-[2-(2-isopropyl-5-benzofuryl)oxyacetoxyl-3,5-
di(tert-butyl)phenylthio]propane
2,2-Bis[4-[2-(2-isopropyl-5-benzofuryl)oxy-2-methyl-
propionoxyl-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
25

Example 12

2,2-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]-2-
methylpropionoxyl-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

268 grams (0.5 mol) of 2,2-bis(3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxyphenylthio)propane and 54 grams (1 mol) of sodium methoxide are introduced into 5 liters of dry benzene; one liter of benzene is distilled off in order to remove the displaced methanol and then 253 grams (1 mol) of 2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]-2-methylpropionyl chloride are gradually added; the mixture is stirred for 30 minutes and then gradually brought to reflux, which reflux is maintained for 30 minutes; the mixture is filtered, without cooling, in order to remove the sodium chloride and then the benzene is evaporated under reduced pressure; the residue is washed with a small amount of pentane and dried under vacuum.

Example 13

By replacing 2,2-bis(3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxyphenylthio)propane with an equimolecular amount
5 of another bis(4-hydroxyphenylthio)alkane in accordance with the formula VII in the reaction of Example 12, it is possible in particular to obtain the following compounds:

- 1,1-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]-2-methylpro-
10 pionoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
1,1-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]-2-methylpro-
pionoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]ethane
2,2-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]-2-methylpro-
pionoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]butane
15 2,2-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]-2-methylpro-
pionoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]hexane
2,2-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]-2-methylpro-
pionoxy]-3,5-di(tert-amyl)phenylthio]propane
2,2-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]-2-methylpro-
20 pionoxy]-3-methyl-5-(tert-butyl)phenylthio]propane
2,2-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]-2-methylpro-
pionoxy]-3-isopropyl-5-(tert-butyl)phenylthio]propane
1,1-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]-2-methylpro-
pionoxy]-3-isopropyl-5-(tert-butyl)phenylthio]ethane
25 2,2-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]-2-methylpro-
pionoxy]-3-isopropyl-5-(tert-butyl)phenylthio]pentane

Example 14

By replacing, in the reactions of Example 12, 2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]-2-methylpropionyl chloride with an
5 equimolecular amount of another acid chloride X-CO-Cl derived from the formula VI, it is possible in particular to obtain the following compounds:

2,2-Bis[4-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]acetoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

10 2,2-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]propionoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]-2-methylpropionoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]-2-ethylpropionoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

15 2,2-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]-2-ethylbutyroxoy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]butyroxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

20 2,2-Bis[4-[5-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]valerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]valerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane


2,2-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]acryloyloxy]-3,5-

25 di(tert-butyl)phenylthio]propane

CLAIMS

1. Industrial products composed of the compounds defined by the following general formula I:

5



in which

R' represents a light alkyl residue or a hydrogen atom;

10

R'' represents a methyl or ethyl residue;





R''' represents a tert-amyl or tert-butyl residue;

R''' represents a light alkyl residue;

X represents one of the residues defined by the

15

following formulae:



in which the N-oxide functional group is optional;
A represents a saturated or ethylenic divalent
hydrocarbonaceous group comprising 1 to 18
straight- or branched-chain carbon atoms which can
optionally carry a ketone oxygen atom or a
hydroxyl group or a phenyl, alkylphenyl,
aralkylphenyl, arylphenyl, acylphenyl,
alkoxyphenyl or halophenyl residue;

B represents a divalent hydrocarbonaceous group
comprising 1 to 5 carbon atoms in a straight or
branched and saturated or ethylenic chain;
Y represents a hydrogen atom or a light alkyl
residue;

Z represents one to three optional substitutions
which can be one or more alkyl residues and/or one
or more alkenyl residues and/or one or more

trifluoromethyl residues and/or one or more
cycloalkyl residues and/or one or more
cycloalkenyl residues and/or one or more aryl
residues and/or one or more aralkyl residues
5 and/or one or more aralkenyl residues and/or one
or more halogens and/or one or more alkoxy groups
and/or one or more alkylthio groups and/or one or
more aryloxy groups and/or one or more aralkoxy
groups and/or one or more arylthio groups and/or
10 one or more aralkylthio groups;

R can also represent a divalent hydrocarbonaceous
group -CH=CH-CH=CH- which joins two vicinal carbon
atoms of the benzene nucleus so as to form a
naphthalene, which itself can carry one or two
15 substitutions listed above and, when one of these
substitutions is a cyclohexyl or cyclohexenyl
residue, the latter can carry a hydroxyl or oxo
functional group and/or an alkyl or alkenyl
residue.

20

2. Industrial product in accordance with the first
claim, composed of 2,2-bis[4-[2-(4-chloro-
phenyl)propionoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]-
propane.

25

3. Industrial products in accordance with the first
claim composed of the following compounds:

- 1,1-Bis[4-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropion-
oxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
1,1-Bis[4-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropion-
oxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]ethane
5 2,2-Bis[4-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropion-
oxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]butane
2,2-Bis[4-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropion-
oxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]hexane
2,2-Bis[4-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropion-
oxy]-3,5-di(tert-amyl)phenylthio]propane
10 2,2-Bis[4-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropion-
oxy]-3-methyl-5-(tert-butyl)phenylthio]propane
2,2-Bis[4-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropion-
oxy]-3-isopropyl-5-(tert-butyl)phenylthio]propane
15 1,1-Bis[4-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropion-
oxy]-3-isopropyl-5-(tert-butyl)phenylthio]ethane
2,2-Bis[4-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropion-
oxy]-3-isopropyl-5-(tert-butyl)phenylthio]pentane.
- 20 4. Products in accordance with the first claim
composed of the following compounds:
2,2-Bis[4-[(4-chlorophenoxy)acetoxy]-3,5-di(tert-
butyl)phenylthio]propane
2,2-Bis[4-[2-(4-chlorophenoxy)propionoxy]-3,5-di-
25 (tert-butyl)phenylthio]propane
2,2-Bis[4-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropion-
oxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

- 2,2-Bis[4-[2-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)-
phenoxy)propionyloxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]-
propane
- 5 2,2-Bis[4-[2-(2,4-dichlorophenoxy)-2-methylpro-
pionyloxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[2-(4-methylphenoxy)-2-
methylpropionyloxy]-3,5-di(tert-
butyl)phenylthio]propane
- 10 2,2-Bis[4-[2-(4-chlorophenoxy)butyroyloxy]-3,5-di-
(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methylbutyroyloxy]-
3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[2-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)-
butyroyloxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 15 2,2-Bis[4-[2-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)-
phenoxy)butyroyloxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]-
propane
- 2,2-Bis[4-[4-methyl-4-phenoxyvalerianoxy]-3,5-di-
(tert-butyl)phenylthio]propane
- 20 2,2-Bis[4-[4-ethyl-4-phenoxyvalerianoxy]-3,5-di-
(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[2,4-dimethyl-4-phenoxyvalerianoxy]-3,5-
di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[2,4-dimethyl-4-phenoxy-2-pentenoyloxy]-
3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 25 2,2-Bis[4-[4-(4-chlorophenoxy)-4-methylvalerian-
oxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[4-(4-chlorophenoxy)-2,4-dimethyl-
valerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
2,2-Bis[4-[4-(4-chlorophenoxy)-2,4-dimethyl-2-
pentenoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
5 2,2-Bis[4-[4-(4-chloro-2-methylphenoxy)-2,4-di-
methylvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]-
propane
2,2-Bis[4-[4-(4-chlorophenoxy)butyryloxy]-3,5-di-
(tert-butyl)phenylthio]propane.

10

5. Products in accordance with the first claim
composed of the following compounds:

2,2-Bis[4-[4-(4-chlorophenoxy)-3-hydroxy-4-methyl-
valerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
15 2,2-Bis[4-[4-(4-chlorophenoxy)-3-oxo-4-methyl-
valerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
2,2-Bis[4-[4-(4-chlorophenoxy)-3-hydroxy-2,4-di-
methylvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]-
propane

20

2,2-Bis[4-[4-(4-chlorophenoxy)-3-oxo-2,4-dimethyl-
valerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
2,2-Bis[4-[4-(4-chlorophenoxy)-3-hydroxy-2-methyl-
valerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
2,2-Bis[4-[4-(2,4-dichlorophenoxy)-3-hydroxy-4-
25 methylvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]-
propane
2,2-Bis[4-[4-(2,4-dichlorophenoxy)-3-oxo-4-methyl-
valerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[4-(2,4-dichlorophenoxy)-3-hydroxy-2-methylvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

5 2,2-Bis[4-[4-(2,4-dichlorophenoxy)-3-oxo-2-methylvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[4-(2,4-dichlorophenoxy)-3-hydroxy-2,4-dimethylvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

10 2,2-Bis[4-[4-(2,4-dichlorophenoxy)-3-oxo-2,4-dimethylvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[4-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)-3-hydroxy-4-methylvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

15 2,2-Bis[4-[4-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)-3-hydroxy-2-methylvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

20 2,2-Bis[4-[4-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)-3-oxo-4-methylvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[4-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)-3-oxo-2-methylvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

25 2,2-Bis[4-[4-(2,4-dimethylphenoxy)-3-hydroxy-4-methylvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[4-(2,4-dimethylphenoxy)-3-oxo-4-methylvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[4-(2,4-dimethylphenoxy)-3-hydroxy-2-methylvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

5 2,2-Bis[4-[4-(2,4-dimethylphenoxy)-3-oxo-2-methylvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-4-chlorophenoxy)-3-hydroxy-4-methylvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

10 2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-4-chlorophenoxy)-3-hydroxy-2-methylvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-4-chlorophenoxy)-3-oxo-4-methylvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

15 2,2-Bis[4-[4-(2-methyl-4-chlorophenoxy)-3-oxo-2-methylvalerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane.

6. Products in accordance with the first claim
20 composed of the following compounds:

2,2-Bis[4-[α -(2-methyl-4-chlorophenoxy)- α -(4-chlorophenyl)acetoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

25 2,2-Bis[4-[α -(2-methyl-4-chlorophenoxy)- α -(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[α -(2,4-dichlorophenoxy)- α -(4-chloro-phenyl)acetoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]-propane

5 2,2-Bis[4-[α -(2,4-dimethylphenoxy)- α -(4-chloro-phenyl)acetoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]-propane

2,2-Bis[4-[α -(4-chlorophenoxy)- α -(4-chlorophenyl)-acetoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

10 2,2-Bis[4-[α -(2,4-dimethylphenoxy)- α -(4-chloro-phenyl)acetoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]-propane

2,2-Bis[4-[α -(4-(trifluoromethyl)phenoxy)- α -(4-chlorophenyl)acetoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

15 2,2-Bis[4-[α -(2-methyl-4-(trifluoromethyl)-phenoxy)- α -(4-chlorophenyl)acetoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane.

7. Products in accordance with the first claim
20 composed of the following compounds:

2,2-Bis[4-[2-(6-cyclohexyl-2-naphthyl)oxy-2-methylpropionoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]-propane

25 2,2-Bis[4-[2-[6-(3-hydroxycyclohexyl)-2-naphthyl]oxy-2-methylpropionoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[2-[6-(3-hydroxy-3-methylcyclohexyl)-2-naphthyl]oxy-2-methylpropionyloxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

5 2,2-Bis[4-[2-[6-(3-hydroxy-1-cyclohexenyl)-2-naphthyl]oxy-2-methylpropionyloxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[2-[6-(3-hydroxy-3-ethylcyclohexyl)-2-naphthyl]oxy-2-methylpropionyloxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

10 2,2-Bis[4[2-[6-(3-hydroxy-3-vinylcyclohexyl)-2-naphthyl]oxy-2-methylpropionyloxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[(6-cyclohexyl-2-naphthyl)oxyacetoxo]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

15 2,2-Bis[4-[[6-(3-oxocyclohexyl)-2-naphthyl]oxyacetoxo]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[2-[6-(3-oxocyclohexyl)-2-naphthyl]oxy-2-methylpropionyloxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]-propane

20 2,2-Bis[4-[[6-(3-oxo-1-cyclohexenyl)-2-naphthyl]oxyacetoxo]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[2-[6-(3-oxo-1-cyclohexenyl)-2-naphthyl]oxy-2-methylpropionyloxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane.

25

8. Industrial product in accordance with the first claim composed of 2,2-bis[4-[2-[4-(1-tetra-

linyl)phenoxy]-2-methylpropiony]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane.

9. Products in accordance with the first claim
5 composed of the following compounds:
- 1,1-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]-2-methyl-
propiony]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
1,1-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]-2-methyl-
propiony]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]ethane
10 2,2-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]-2-methyl-
propiony]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]butane
2,2-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]-2-methyl-
propiony]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]hexane
2,2-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]-2-methyl-
15 propiony]-3,5-di(tert-amyl)phenylthio]propane
2,2-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]-2-methyl-
propiony]-3-methyl-5-(tert-butyl)phenylthio]-
propane
2,2-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]-2-methyl-
20 propiony]-3-isopropyl-5-(tert-butyl)phenyl-
thio]propane
1,1-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]-2-methyl-
propiony]-3-isopropyl-5-(tert-butyl)phenylthio]-
ethane
25 2,2-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]-2-methyl-
propiony]-3-isopropyl-5-(tert-butyl)phenyl-
thio]pentane.

10. Products in accordance with the first claim composed of the following compounds:

2,2-Bis[4-[4-(1-tetralinyl)phenoxyacetoxy]-3,5-di-(tert-butyl)phenylthio]propane

5 2,2-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]propionoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]-2-methylpropionoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

10 2,2-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]-2-ethylpropionoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]-2-ethylbutyroxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]butyroxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

15 2,2-Bis[4-[5-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]valerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

2,2-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]valerianoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

20 2,2-Bis[4-[2-[4-(1-tetralinyl)phenoxy]acryloyloxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane.

11. Industrial product in accordance with the first claim composed of 2,2-bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxy-2-methylpropionoxy]-3,5-di(tert-butyl)-phenylthio]propane.
- 25

12. Industrial products in accordance with the first claim composed of the following compounds:

- 1,1-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxy-2-methyl-propionoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
1,1-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxy-2-methyl-propionoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]ethane
5 2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxy-2-methyl-propionoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]butane
2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxy-2-methyl-propionoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]hexane
2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxy-2-methyl-propionoxy]-3,5-di(tert-amyl)phenylthio]propane
10 2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxy-2-methyl-propionoxy]-3-methyl-5-(tert-butyl)phenylthio]-propane
2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxy-2-methyl-propionoxy]-3-isopropyl-5-(tert-butyl)phenylthio]-propane
15 1,1-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxy-2-methyl-propionoxy]-3-isopropyl-5-(tert-butyl)phenylthio]-ethane
20 2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxy-2-methyl-propionoxy]-3-isopropyl-5-(tert-butyl)phenylthio]-pentane.
13. Industrial products in accordance with the first
25 claim composed of the following compounds:
2,2-Bis[4-[2-(5-benzofuryl)oxyacetoxy]-3,5-di-(tert-butyl)phenylthio]propane

- 2,2-Bis[4-[2-(5-benzofuryl)oxypropionoxy]-3,5-di-
(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[2-(5-benzofuryl)oxy-2-methylpropion-
oxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 5 2,2-Bis[4-[2-(5-benzofuryl)oxy-2-ethylpropionoxy]-
3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[2-(5-benzofuryl)oxy-2-ethylbutyroxy]-
3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[2-(5-benzofuryl)oxy-2-methylbutyroxy]-
10 3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[2-(5-benzofuryl)oxybutyroxy]-3,5-di-
(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[4-(5-benzofuryl)oxybutyroxy]-3,5-di-
(tert-butyl)phenylthio]propane
- 15 2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxy-2-ethyl-
propionoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxy-2-ethyl-
butyroxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxyacetoxyl]-
20 3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxypropion-
oxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxybutyroxy]-
3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 25 2,2-Bis[4-[4-(2-methyl-5-benzofuryl)oxybutyroxy]-
3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
- 2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxyvalerian-
oxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

- 2,2-Bis[4-[3-(2-methyl-5-benzofuryl)oxypropion-
oxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
2,2-Bis[4-[2-(2-methyl-5-benzofuryl)oxyacryloyl-
oxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
5 2,2-Bis[4-[2-(2-ethyl-5-benzofuryl)oxy-2-methyl-
propionoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
2,2-Bis[4-[2-(2-isopropyl-5-benzofuryl)oxyacet-
oxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane
2,2-Bis[4-[2-(2-isopropyl-5-benzofuryl)oxy-2-
10 methylpropionoxy]-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]-
propane.
14. Industrial product in accordance with the first
claim composed of 2,2-bis(4-nicotinoyloxy-3,5-
15 di(tert-butyl)phenylthio)propane.
15. Industrial products in accordance with the first
claim composed of the following compounds:
1,1-Bis(4-nicotinoyloxy-3,5-di(tert-butyl)phenyl-
20 thio)propane
1,1-Bis(4-nicotinoyloxy-3,5-di(tert-butyl)phenyl-
thio)ethane
2,2-Bis(4-nicotinoyloxy-3,5-di(tert-butyl)phenyl-
thio)butane
2,2-Bis(4-nicotinoyloxy-3,5-di(tert-butyl)phenyl-
25 thio)hexane
2,2-Bis(4-nicotinoyloxy-3,5-di(tert-amyl)phenyl-
thio)propane

2,2-Bis(4-nicotinoyloxy-3-methyl-5-(tert-butyl)-
phenylthio)propane

2,2-Bis(4-nicotinoyloxy-3-isopropyl-5-(tert-
butyl)phenylthio)propane

5 1,1-Bis(4-nicotinoyloxy-3-isopropyl-5-(tert-
butyl)phenylthio)ethane

2,2-Bis(4-nicotinoyloxy-3-isopropyl-5-(tert-
butyl)phenylthio)pentane.

10 16. Industrial products in accordance with the first
claim composed of the following compounds:

2,2-Bis(4-(N-oxynicotinoyloxy)-3,5-di(tert-butyl)-
phenylthio)propane

15 1,1-Bis(4-(N-oxynicotinoyloxy)-3,5-di(tert-butyl)-
phenylthio)propane

1,1-Bis(4-(N-oxynicotinoyloxy)-3,5-di(tert-butyl)-
phenylthio)ethane

2,2-Bis(4-(N-oxynicotinoyloxy)-3,5-di(tert-butyl)-
phenylthio)butane

20 2,2-Bis(4-(N-oxynicotinoyloxy)-3,5-di(tert-butyl)-
phenylthio)hexane

2,2-Bis(4-(N-oxynicotinoyloxy)-3,5-di(tert-amyl)-
phenylthio)propane

25 2,2-Bis(4-(N-oxynicotinoyloxy)-3-methyl-5-(tert-
butyl)phenylthio)propane

2,2-Bis(4-(N-oxynicotinoyloxy)-3-isopropyl-5-
(tert-butyl)phenylthio)propane

1,1-Bis(4-(N-oxynicotinoyloxy)-3-isopropyl-5-(tert-butyl)phenylthio)ethane
2,2-Bis(4-(N-oxynicotinoyloxy)-3-isopropyl-5-(tert-butyl)phenylthio)pentane.

5

17. Industrial product in accordance with the first claim composed of 2,2-bis[4-(5-thiazolylcarbonyloxy)-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane.

10 18. Industrial products in accordance with the first claim composed of the following compounds:

1,1-Bis[4-(5-thiazolylcarbonyloxy)-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]propane

15 1,1-Bis[4-(5-thiazolylcarbonyloxy)-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]ethane

2,2-Bis[4-(5-thiazolylcarbonyloxy)-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]butane

2,2-Bis[4-(5-thiazolylcarbonyloxy)-3,5-di(tert-butyl)phenylthio]hexane

20 2,2-Bis[4-(5-thiazolylcarbonyloxy)-3,5-di(tert-amyl)phenylthio]propane


2,2-Bis[4-(5-thiazolylcarbonyloxy)-3-methyl-5-(tert-butyl)phenylthio]propane

25 2,2-Bis[4-(5-thiazolylcarbonyloxy)-3-isopropyl-5-(tert-butyl)phenylthio]propane

1,1-Bis[4-(5-thiazolylcarbonyloxy)-3-isopropyl-5-(tert-butyl)phenylthio]ethane

2,2-Bis[4-(5-thiazolylcarbonyloxy)-3-isopropyl-5-(tert-butyl)phenylthio]pentane.

19. Manufacturing process consisting of the action of
5 a halide or an anhydride derived from an acid of
general formula $X-COOH$, X being as said in the
first claim, on a bis(4-hydroxyphenylthio)alkane
defined by the following general formula VII:



in which R' , R'' , R''' and R'''' are as said in the
first claim.

20. Process in accordance with Claim 19, characterized
by the presence, in the reaction medium, of an
inorganic base or of a tertiary amine or of a
tertiary nitrogenous heterocycle.
21. Process in accordance with Claim 19, characterized
by the use of an O-metallic derivative of the
bis(4-hydroxyphenylthio)alkane of formula VII.

(19) REPUBLIQUE FRANCAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

(11) N° de publication :
(A n'utiliser que pour
le classement et les
commandes de reproduction).

2.168.137

(21) N° d'enregistrement national

72.01439

(A utiliser pour les paiements d'annuités,
les demandes de copies officielles et toutes
autres correspondances avec l'I.N.P.I.)


DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

1^{re} PUBLICATION

- (22) Date de dépôt 17 janvier 1972, à 15 h 27 mn.
(41) Date de la mise à la disposition du
public de la demande..... B.O.P.I. - «Listes» n. 35 du 31-8-1973.
- (51) Classification internationale (Int. Cl.) A 61 k 27/00//C 07 c 149/00;
C 07 d 5/00, 31/00, 91/00.
- (71) Déposant : DYNACHIM, Société à responsabilité limitée, 16, avenue de Friedland,
75008 Paris.
- (73) Titulaire : *Idem* (71)
- (74) Mandataire :
- (54) Dérivés des bis (hydroxy-4 phénylthio) alcanes.
- (72) Invention de :
- (33) (32) (31) Priorité conventionnelle :

La présente invention se rapporte à des produits industriels nouveaux constitués par des esters dérivés des bis(hydroxy-4 phénylthio) alcanes.

Les composés visés par l'invention sont définis par la for-
5 mule générale I ci-après :








Dans cette formule, R' représente un reste alcoyle léger ou
15 un atome d'hydrogène ;

R' représente un reste méthyle ou éthyle ;

R''' représente un reste tertioamyle ou tertibutyle ;

R " " représente un reste alcoyle léger ;

X représente un des restes définis par les formules suivantes :



dans lesquelles la fonction N-oxyde est facultative ;

A représente un groupe hydrocarboné divalent saturé ou éthylénique comprenant 1 à 18 atomes de carbone en chaîne droite ou ramifiée et pouvant, facultativement, porter un atome d'oxygène cétonique ou un groupe hydroxy ou un reste phényle, alcoyphényle, aralcoylphényle, arylphényle, acylphényle, alcoxyphényle ou halogénophényle ;

B représente un groupe hydrocarboné divalent contenant un à cinq atomes de carbone en chaîne droite ou ramifiée saturée ou éthylénique.

Y représente un atome d'hydrogène ou un reste alcoyle léger.


Z représente une à trois substitutions facultatives pouvant être un ou des restes alcoyle et/ou un ou des restes alcényle et/ou un ou des restes trifluorométhyle et/ou un ou des restes cycloalcoyle et/ou un ou des restes cycloalcényle et/ou un ou des restes aryle et/ou un ou des restes aralcoyle et/ou un ou des restes aralcényle et/ou un ou des halogènes et/ou un ou des groupes alcoxy et/ou un ou des groupes alcoylthio et/ou un ou des groupes aryloxy et/ou un ou des groupes aralcoxy et/ou un ou des groupes arylthio et/ou un ou des groupes aralcoylthio ;

R peut aussi représenter un groupe hydrocarboné divalent $-CH=CH-$ $CH=CH-$ joignant deux atomes de carbone vicaux du noyau benzénique de façon à former un naphthalène pouvant lui-même porter une ou deux substitutions ci-dessus énumérées et, lorsque l'une de ces substitutions est un reste cyclohexyle ou cyclohexenyle, celui-ci pouvant porter une fonction hydroxy- ou oxo et/ou un reste alcoyle ou alcényle ;

Les composés de l'invention possèdent des propriétés pharmacodynamiques, hypocholestérolémiantes et hypolipémiantes.

L'invention vise aussi les procédés de fabrication des composés définis par la formule générale ci-dessus.

Ces procédés consistent dans l'action de l'halogénure ou de l'anhydride d'un acide de formule générale $X-COOH$ sur un bis (hydroxy-4 phénylthio) alcane de formule générale VII suivante



dans laquelle R', R'', R''' sont tels qu'ils ont été précisés précédemment ;

La réaction est effectuée, de préférence, dans un liquide inerte servant de solvant ou support, comme par exemple, un hydrocarbure, un éther-oxyde, un hétérocycle oxygéné, un N,N-dialcoylamide, ou leurs mélanges ; on opère, de préférence, à une température supérieure à celle de l'ambiante comme, par exemple, celle du reflux du solvant ou support utilisé.

On opère, de préférence, en présence d'une base destinée à fixer l'acide halohydrique déplacé dans la réaction, ladite base pouvant être, par exemple, un hydroxyde ou un carbonate alcalin, une amine tertiaire ou un hétérocycle azoté tertiaire, ces derniers pouvant servir en partie ou en totalité de solvant des réactifs en présence. On peut aussi utiliser un dérivé O-métallique préalablement isolé du bis (hydroxy-4 phénylthio) alcane.

Exemple 1

Bis [(chloro-4 phénoxy)-2 méthyl-2 propionoxy]-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio]-2,2 propane.

266 grammes (0,5 mole) de bis (ditertiobutyl-3,5 hydroxy-4 phénylthio)-2,2 propane et 101 grammes (1 mole) de triéthylamine sont introduits dans 4 litres de benzène sec ; on ajoute peu à peu 216 grammes (1 mole) de chlorure de (chloro-4 phénoxy)-2 méthyl-2 propionyle ; on agite pendant 30 minutes puis porte progressivement au reflux qu'on maintient pendant 30 minutes ; on filtre, sans refroidir, pour éliminer le chlorhydrate de triéthylamine puis évapore le benzène sous pression réduite ; on lave avec un peu de pentane et sèche sous vide.

Exemple 2

En remplaçant le bis (ditertiobutyl-3,5 hydroxy-4 phénylthio)-2,2 propane par une quantité équimoléculaire d'un autre bis (hydroxy-4 phénylthio)alcane, conforme à la formule III, dans la réaction de l'exemple I, on peut, notamment, obtenir les composés suivants :

Bis [(chloro-4 phénoxy)-2 méthyl-2 propionoxy]-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio]-1,1 propane

Bis [(chloro-4 phénoxy)-2 méthyl-2 propionoxy]-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio]-1,1 éthane

Bis [(chloro-4 phénoxy)-2 méthyl-2 propionoxy]-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio]-2,2 butane

- Bis [] (chloro-4 phénoxy)-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 hexane
 Bis [] (chloro-4 phénoxy)-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 ditertica-
 myl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane
 5 Bis [] (chloro-4 phénoxy)-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 méthyl-3
 tertibutyl-5 phénylthio-7-2,2 propane
 Bis [] (chloro-4 phénoxy)-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 isopropyl-3
 tertibutyl-5 phénylthio-7-2,2 propane
 Bis [] (chloro-4 phénoxy)-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 isopropyl-3
 10 tertibutyl-5 phénylthio-7-1,1 éthane
 Bis [] (chloro-4 phénoxy)-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 isopropyl-3
 tertibutyl-5 phénylthio-7-2,2 pentane

Exemple 3

- En remplaçant le chlorure de (chloro-4 phénoxy)-2 méthyl-2
 15 propionyle, dans la réaction de l'exemple 1, par une quantité
 équimoléculaire d'un autre chlorure X-CO-Cl conforme à la formu-
 le II, on peut, notamment obtenir les composés suivants :
 Bis [] (chloro-4 phénoxy)acétoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phényl-
 thio-7-2,2 propane
 20 Bis [] (chloro-4 phénoxy)-2 propionoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5
 phénylthio-7-2,2 propane
 Bis [] (chloro-4 phénoxy)-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 ditertiobu-
 tyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane
 Bis [] méthyl-2 (trifluorométhyl-4 phénoxy)-2 propionoxy-7-4
 25 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane
 Bis [] (dichloro-2,4 phénoxy)-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 diter-
 tiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane
 Bis [] (méthyl-4 phénoxy)-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 ditertiobu-
 tyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane
 30 Bis [] (chloro-4 phénoxy)-2 butyroxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phé-
 nylthio-7-2,2 propane
 Bis [] (chloro-4 phénoxy)-2 méthyl-2 butyroxy-7-4 ditertiobutyl
 3,5 phénylthio-7-2,2 propane
 Bis [] (trifluorométhyl-4 phénoxy)-2 butyroxy-7-4 ditertiobutyl-
 35 3,5 phénylthio-7-2,2 propane
 Bis [] méthyl-2 (trifluorométhyl-4 phénoxy)-2 butyroxy-7-4 di-
 tertibutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane
 Bis [] méthyl-4 phénoxy-4 valérianoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phé-
 nylthio-7-2,2 propane

- Bis [[Ethyl-4 phénoxy-4 valérianoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- Bis [[Diméthyl-2,4 phénoxy-4 valérianoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- 5 Bis [[Diméthyl-2,4 phénoxy-4 pentène-2 cyloxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- Bis [[(chloro-4 phénoxy)-4 méthyl-4 valérianoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- Bis [[(chloro-4 phénoxy)-4 diméthyl-2,4 valérianoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- 10 Bis [[(chloro-4 phénoxy)-4 diméthyl-2,4 pentène-2 cyloxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- Bis [[(chloro-4 méthyl-2 phénoxy)-4 diméthyl-2,4 valérianoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- 15 Bis [[(chloro-4 phénoxy)-4 butyroxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- Bis [[(chloro-4 phénoxy)-4 hydroxy-3 méthyl-4 valérianoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- Bis [[(chloro-4 phénoxy)-4 oxo-3 méthyl-4 valérianoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- 20 Bis [[(chloro-4 phénoxy)-4 hydroxy-3 diméthyl-2,4 valérianoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- Bis [[(chloro-4 phénoxy)-4 oxo-3 diméthyl-2,4 valérianoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- 25 Bis [[(chloro-4 phénoxy)-4 hydroxy-3 méthyl-2 valérianoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- Bis [[(dichloro-2,4 phénoxy)-4 hydroxy-3 méthyl-4 valérianoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- Bis [[(dichloro-2,4 phénoxy)-4 oxo-3 méthyl-4 valérianoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- 30 Bis [[(dichloro-2,4 phénoxy)-4 hydroxy-3 méthyl-2 valérianoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- Bis [[(dichloro-2,4 phénoxy)-4 oxo-3 méthyl-2 valérianoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- 35 Bis [[(dichloro-2,4 phénoxy)-4 hydroxy-3 diméthyl-2,4 valérianoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- Bis [[(dichloro-2,4 phénoxy)-4 oxo-3 diméthyl-2,4 valérianoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- Bis [[(trifluorométhyl-4 phénoxy)-4 hydroxy-3 méthyl-4 valéri-

- anoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [(trifluorométhyl-4 phénoxy)-4 hydroxy-3 méthyl-2 valéri-
 anoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [(trifluorométhyl-4 phénoxy)-4 oxo-3 méthyl-4 valérianoxy
 5 7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [(trifluorométhyl-4 phénoxy)-4 oxo-3 méthyl-2 valérianoxy_7
 -4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [(diméthyl-2,4 phénoxy)-4 hydroxy-3 méthyl-4 valérianoxy_7
 -4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 10 Bis [(diméthyl-2,4 phénoxy)-4 oxo-3 méthyl-4 valérianoxy_7-4
 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [(diméthyl-2,4 phénoxy)-4 hydroxy-3 méthyl-2 valérianoxy_7
 -4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [(diméthyl-2,4 phénoxy)-4 oxo-3 méthyl-2 valérianoxy_7-4
 15 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [(méthyl-2 chloro-4 phénoxy)-2 hydroxy-3 méthyl-4 valéri-
 anoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [(méthyl-2 chloro-4 phénoxy)-2 hydroxy-3 méthyl-2 valéri-
 anoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 20 Bis [(méthyl-2 chloro-4 phénoxy)-2 oxo-3 méthyl-4 valérianoxy-
 4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [(méthyl-2 chloro-4 phénoxy)-4 oxo-3 méthyl-2 valérianoxy
 _7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [a-(méthyl-2 chloro-4 phénoxy) a-(chloro-4 phényl)acétoxy_7
 25 -4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [a-(méthyl-2 chloro-4 phénoxy) a-(trifluorométhyl-4 phényl)
 acétoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [a-(dichloro-2,4 phénoxy) a-(chloro-4 phényl) acétoxy_7-4
 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 30 Bis [a-(diméthyl-2,4 phénoxy) a-(chloro-4 phényl)acétoxy_7-4
 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [a-(chloro-4 phénoxy) a-(chloro-4 phényl)acétoxy_7-4 ditér-
 tiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [a-diméthyl-2,4 phénoxy) a-(chloro-4 phényl)acétoxy_7-4
 35 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [a-(trifluorométhyl-4 phénoxy) a-(chloro-4 phényl)acétoxy_7
 -4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [a-(méthyl-2 trifluorométhyl-4 phénoxy) a-(chloro-4 phényl)
 acétoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane

- Bis $\square\square$ (cyclohexyl-6 naphthyl-2)oxy-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 di-
tertbutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane
- Bis $\square\square\square$ (hydroxy-3 cyclohexyl)-6 naphthyl-2-7oxy-2 méthyl-2 pro-
pionoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane
- 5 Bis $\square\square\square$ (hydroxy-3 méthyl-3 cyclohexyl)-6 naphthyl-2-7oxy-2 mé-
thyl-2 propionoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane
- Bis $\square\square\square$ (hydroxy-3 cyclohexène-1 yl)-6 naphthyl-2-7oxy-2 méthyl-
2 propionoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane
- Bis $\square\square\square$ (hydroxy-3 éthyl-3 cyclohexyl)-6 naphthyl-2-7oxy-2 mé-
thyl-2 propionoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane
- 10 Bis $\square\square\square$ (hydroxy-3 vinyl-3 cyclohexyl)-6 naphthyl-2-7oxy-2 mé-
thyl-2 propionoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane
- Bis $\square\square$ (cyclohexyl-6 naphthyl-2) oxyacétoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5
phénylthio-7-2,2 propane
- 15 Bis $\square\square\square$ (oxo-3 cyclohexyl-6)naphthyl-2-7oxyacétoxy-7-4 ditertio-
butyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane
- Bis $\square\square\square$ (oxo-3 cyclohexyl)-6 naphthyl-2-7oxy-2 méthyl-2 propio-
noxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane
- Bis $\square\square\square$ (oxo-3 cyclohexène-1 yl)-6 naphthyl-2-7oxyacétoxy-7-4
- 20 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane
- Bis $\square\square\square$ (oxo-3 cyclohexène-1 yl)-6 naphthyl-2-7oxy-2 méthyl-2
propionoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane

Exemple 4

- Bis(nicotinoyloxy-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio)-2,2 propane
- 25 268 grammes (0,5 mole) de bis (ditertiobutyl-3,5 hydroxy-4
phénylthio)-2,2 propane et 101 grammes (1 mole) de triéthylamine
sont introduits dans 4 litres de benzène sec ; on ajoute peu à
peu 142 grammes (1 mole) de chlorure de nicotinoyle ; on agite
pendant 30 minutes puis porte progressivement au reflux qu'on
- 30 maintient pendant 30 minutes ; on filtre, sans refroidir, pour
éliminer le chlorhydrate de triéthylamine puis évapore le benzène
sous pression réduite ; on lave avec un peu de pentane et sèche
sous vide.

Exemple 5

- 35 En remplaçant le bis (ditertiobutyl-3,5 hydroxy-4 phénylthio)
-2,2 propane par une quantité équimoléculaire d'un autre bis (hy-
droxy-4 phénylthio) alcane, conforme à la formule VIII, dans la
réaction de l'exemple 4, on peut, notamment, obtenir les compo-
sés suivants :

- Bis(nicotinoyloxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio)-1,1 propane
 Bis(nicotinoyloxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio)-1,1 éthane
 Bis(nicotinoyloxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio)-2,2 butane
 Bis(nicotinoyloxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio)-2,2 hexane
 5 Bis(nicotinoyloxy)-4 diterticamyl-3,5 phénylthio)-2,2 propane
 Bis(nicotinoyloxy)-4 méthyl-3 tertiobutyl-5 phénylthio)-2,2 propane
 Bis(nicotinoyloxy)-4 isopropyl-3 tertiobutyl-5 phénylthio)-2,2 propane
 10 Bis(nicotinoyloxy)-4 isopropyl-3 tertiobutyl-5 phénylthio)-1,1 éthane
 Bis(nicotinoyloxy)-4 isopropyl-3 tertiobutyl-5 phénylthio)-2,2 pentane

Exemple 6

- 15 En remplaçant le chlorure de nicotinoyl par une quantité équimoléculaire de chlorure de N-oxyde de nicotinoyl dans les exemples 4 et 5, on peut, notamment, obtenir les composés suivants :
- Bis(N-oxynicotinoyloxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio)-2,2 propane
 20 ne
 Bis(nicotinoyloxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio)-1,1 propane
 Bis(N-oxynicotinoyloxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio)-1,1 éthane
 Bis(N-oxynicotinoyloxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio)-2,2 butane
 25 ne
 Bis-(N-oxynicotinoyloxy)-4 ditertiobutyl 3,5 phénylthio)-2,2 hexane
 Bis-(N-oxynicotinoyloxy)-4 ditertioamyl-3,5 phénylthio)-2,2 propane
 30 Bis-(N-oxynicotinoyloxy)-4 méthyl-3 tertiobutyl-5 phénylthio)-2,2 propane
 Bis(N-oxynicotinoyloxy)-4 isopropyl-3 tertiobutyl-5 phénylthio)-2,2 propane
 Bis(N-oxynicotinoyloxy)-4 isopropyl-3 tertiobutyl-5 phénylthio)-1,1 éthane
 35 1 éthane
 Bis(N-oxynicotinoyloxy)-4 isopropyl-3 tertiobutyl-5 phénylthio)-2,2 pentane

Exemple 7

Bis [(thiazole-5 carboxy) -4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio] -2,2

propane

268 grammes (0,5 mole) de bis (ditertiobutyl-3,5 hydroxy-4 phénylthio)-2,2 propane et 101 grammes (1 mole) de triéthylamine sont introduits dans 4 litres de benzène sec ; on ajoute peu à peu 148 grammes (1 mole) de chlorure de thiazole-5 carbonyle ; on agite pendant 30 minutes puis porte progressivement au reflux qu'on maintient pendant 30 minutes ; on filtre, sans refroidir, pour éliminer le chlorhydrate de triéthylamine puis évapore le benzène sous pression réduite ; on lave avec un peu de pentane et sèche sous vide.

Exemple 8

En remplaçant le bis (ditertiobutyl-3,5 hydroxy-4 phénylthio)-2,2 propane par une quantité équimoléculaire d'un autre bis (hydroxy-4 phénylthio)alcane, conforme à la formule VII, dans la réaction de l'exemple 7 on peut, notamment, obtenir les composés suivants :

- Bis \angle (thiazole-5 carboxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-1,1 propane
- Bis \angle (thiazole-5 carboxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-1,1 éthane
- Bis \angle (thiazole-5 carboxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 butane
- Bis \angle (thiazole-5 carboxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 hexane
- Bis \angle (thiazole-5 carboxy)-4 ditertioamyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane
- Bis \angle (thiazole-5 carboxy)-4 méthyl-3 tertibutyl-5 phénylthio-7-2,2 propane
- Bis \angle (thiazole-5 carboxy)-4 isopropyl-3 tertibutyl-5 phénylthio-7-2,2 propane
- Bis \angle (thiazole-5 carboxy)-4 isopropyl-3 tertibutyl-5 phénylthio-7-1,1 éthane
- Bis \angle (thiazole-5 carboxy)-4 isopropyl-3 tertibutyl-5 phénylthio-7-2,2 pentane

Exemple 9

Bis $\angle\angle$ (méthyl-2 benzofuranne-5) oxv-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane.

268 grammes (0,5 mole) de bis (ditertiobutyl-3,5 hydroxy-4 phénylthio)-2,2 propane et 101 grammes (1 mole) de triéthylamine

sont introduits dans 4 litres de benzène sec ; on ajoute peu à peu 253 grammes (1 mole) de chlorure de (méthyl-2 benzofuranne-5) oxy-2 méthyl-2 propionyle ; on agite pendant 30 minutes puis porte progressivement au reflux qu'on maintient pendant 30 minutes ;
 5 on filtre, sans refroidir, pour éliminer le chlorhydrate de triéthylamine puis évapore le benzène sous pression réduite ; on lave avec un peu de pentane et sèche sous vide.

Exemple 10

En remplaçant le bis (ditertiobutyl-3,5 hydroxy-4 phénylthio) -2,2 propane par une quantité équimoléculaire d'un autre bis (hydroxy-4 phénylthio)alcane, conforme à la formule VII, dans la réaction de l'exemple 9, on peut, notamment, obtenir les composés suivants :

- 10 Bis $\left[\left[\text{(méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 méthyl-2 propionoxy}_7\text{-4} \right. \right.$
 ditertiobutyl-3,5 phénylthio $\left. \right]_{-1,1}$ propane
 Bis $\left[\left[\text{(méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 méthyl-2 propionoxy}_7\text{-4} \right. \right.$
 ditertiobutyl-3,5 phénylthio $\left. \right]_{-1,1}$ éthane
 Bis $\left[\left[\text{(méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 méthyl-2 propionoxy}_7\text{-4} \right. \right.$
 ditertiobutyl-3,5 phénylthio $\left. \right]_{-2,2}$ butane
 20 Bis $\left[\left[\text{(méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 méthyl-2 propionoxy}_7\text{-4} \right. \right.$
 ditertiobutyl-3,5 phénylthio $\left. \right]_{-2,2}$ hexane
 Bis $\left[\left[\text{(méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 méthyl-2 propionoxy}_7\text{-4} \right. \right.$
 ditertioamyl-3,5 phénylthio $\left. \right]_{-2,2}$ propane
 Bis $\left[\left[\text{(méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 méthyl-2 propionoxy}_7\text{-4} \right. \right.$
 25 méthyl-3 tertibutyl-5 phénylthio $\left. \right]_{-2,2}$ propane
 Bis $\left[\left[\text{(méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 méthyl-2 propionoxy}_7\text{-4} \right. \right.$
 isopropyl-3 tertibutyl-5 phénylthio $\left. \right]_{-2,2}$ propane
 Bis $\left[\left[\text{(méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 méthyl-2 propionoxy}_7\text{-4} \right. \right.$
 isopropyl-3 tertibutyl-5 phénylthio $\left. \right]_{-1,1}$ éthane
 30 Bis $\left[\left[\text{(méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 méthyl-2 propionoxy}_7\text{-4} \right. \right.$
 isopropyl-3 tertibutyl-5 phénylthio $\left. \right]_{-2,2}$ pentane

Exemple 11

En remplaçant le chlorure de (méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 méthyl-2 propionyle, dans la réaction de l'exemple 9, par une
 35 quantité équimoléculaire d'un autre chlorure X-CO-C1 conforme à la formule II, on peut, notamment, obtenir les composés suivants :

- Bis $\left[\left[\text{(benzofuranne-5)oxy-2 acétoxy}_7\text{-4} \right. \right.$ ditertiobutyl-3,5 phénylthio $\left. \right]_{-2,2}$ propane

- Bis [] (benzofuranne-5)oxy-2 propionoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5
phénylthio_7-2,2 propane
- Bis [] (benzofuranne-5)oxy-2 méthyl-2 propionoxy_7-4 ditertio-
butyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- 5 Bis [] (benzofuranne-5)oxy-2 éthyl-2 propionoxy_7-4 ditertio-
butyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- Bis [] (benzofuranne-5)oxy-2 éthyl-2 butyroxoy_7-4 ditertiobutyl-
3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- Bis [] (benzofuranne-5)oxy-2 méthyl-2 butyroxoy_7-4 ditertiobu-
10 tyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- Bis [] (benzofuranne-5)oxy-2 butyroxoy_7-4 ditertiobutyl-3,5
phénylthio_7-2,2 propane
- Bis [] (benzofuranne-5)oxy-4 butyroxoy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phé-
nylthio_7-2,2 propane
- 15 Bis [] (méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 éthyl-2 propionoxy_7-4
ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- Bis [] (méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 éthyl-2 butyroxoy_7-4 di-
tertobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- Bis [] (méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 acétoxy_7-4 ditertiobutyl
20 -3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- Bis [] (méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 propionoxy_7-4 ditertiobu-
tyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- Bis [] (méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 butyroxoy_7-4 ditertiobutyl
-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- 25 Bis [] (méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-4 butyroxoy_7-4 ditertiobutyl
-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- Bis [] (méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 valérianoxy_7-4 ditertio-
butyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- 30 Bis [] (méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-3 propionoxy_7-4 ditertio-
butyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- Bis [] (méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 acryloyloxy_7-4 ditertio-
butyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- Bis [] (éthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 méthyl-2 propionoxy_7-4
ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- 35 Bis [] (isopropyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 acétoxy_7-4 ditertio-
butyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- Bis [] (isopropyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 méthyl-2 propionoxy_7
-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane

Exemple 12

Bis [[[(tétralinyl)-4 phénoxy-7-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 di-tert-butyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane.

- 268 grammes (0,5 mole) de bis (ditertiobutyl-3,5 hydroxy-4 phénylthio)-2,2 propane et 54 grammes (1 mole) de méthoxyde de sodium sont introduits dans 5 litres de benzène sec ; on distille un litre de benzène pour éliminer le méthanol déplacé puis on ajoute peu à peu 253 grammes (1 mole) de chlorure de [(tétralinyl-1)-4 phénoxy-7-2 méthyl-2 propionyle ; on agite pendant 30 minutes puis porte progressivement au reflux qu'on maintient pendant 30 minutes ; on filtre, sans refroidir, pour éliminer le chlorure de sodium, puis évapore le benzène sous pression réduite ; on lave avec un peu de pentane et sèche sous vide.

Exemple 13

- En remplaçant le bis(ditertiobutyl-3,5 hydroxy-4 phénylthio)-2,2 propane par une quantité équimoléculaire d'un autre bis (hydroxy-4 phénylthio)alcane, conforme à la formule VII, dans la réaction de l'exemple 12, on peut, notamment, obtenir les composés suivants :

- Bis [[[(tétralinyl-1)-4 phénoxy-7-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-1,1 propane
 Bis [[[(tétralinyl-1)-4 phénoxy-7-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-1,1 éthane
 Bis [[[(tétralinyl-1)-4 phénoxy-7-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 butane
 Bis [[[(tétralinyl-1)-4 phénoxy-7-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 hexane
 Bis [[[(tétralinyl-1)-4 phénoxy-7-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 ditertioamyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane
 Bis [[[(tétralinyl-1)-4 phénoxy-7-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 méthyl-3 tertibutyl-5 phénylthio-7-2,2 propane
 Bis [[[(tétralinyl-1)-4 phénoxy-7-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 isopropyl-3 tertibutyl-5 phénylthio-7-2,2 propane
 Bis [[[(tétralinyl-1)-4 phénoxy-7-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 isopropyl-3 tertibutyl-5 phénylthio-7-1,1 éthane
 Bis [[[(tétralinyl-1)-4 phénoxy-7-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 isopropyl-3 tertibutyl-5 phénylthio-7-2,2 pentane


Exemple 14

En remplaçant, dans les réactions de l'exemple 12, le chlorure de [(tétralinyl-1)-4 phénoxy-7-2 méthyl-2 propionyle par une

- 5 Bis [[(tétraliny1-1)-4 phénoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5
 phénylthio_7-1,1 propane
 Bis [[[(tétraliny1-1)-4 phénoxy_7-2 propionoxy_7-4 ditertiobu-
 tyl-3,5 phénylthio_7-1,1 propane
 Bis [[[(tétraliny1-1)-4 phénoxy_7-2 méthyl-2 propionoxy_7-4
 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-1,1 propane
 10 Bis [[[(tétraliny1-1)-4 phénoxy_7-2 éthyl-2 propionoxy_7-4 di-
 tertibutyl-3,5 phénylthio_7-1,1 propane
 Bis [[[(tétraliny1-1)-4 phénoxy_7-2 éthyl-2 butyroxy_7-4 di-
 tertibutyl-3,5 phénylthio_7-1,1 propane
 Bis [[[(tétraliny1-1)-4 phénoxy_7-2 butyroxy_7-4 ditertiobutyl
 15 -3,5 phénylthio_7-1,1 propane
 Bis [[[(tétraliny1-1)-4 phénoxy_7-5 valérianoxy_7-4 ditertio-
 butyl-3,5 phénylthio_7-1,1 propane
 Bis [[[(tétraliny1-1)-4 phénoxy_7-2 valérianoxy_7-4 ditertio-
 butyl-3,5 phénylthio_7-1,1 propane
 20 Bis [[[(tétraliny1-1)-4 phénoxy_7-2 acryloxy_7-4 ditertiobu-
 tyl-3,5 phénylthio_7-1,1 propane

REVENDICATIONS

1°. Produits industriels constitués par les composés définis par la formule générale I suivante :



dans laquelle R' représente un reste alcoyle léger ou un atome d'hydrogène ;



15 R'' représente un reste méthyle ou éthyle ;

R''' représente un reste tertioamyle ou tertiobutyle ;


R'''' représente un reste alcoyle léger ;

X représente un des restes définis par les formules suivantes :


20



25



30



35

dans lesquelles la fonction N-oxyde est facultative ;

A représente un groupe hydrocarboné divalent saturé ou éthylénique comprenant 1 à 16 atomes de carbone en chaîne droite ou ramifiée et pouvant, facultativement, porter un atome d'oxygène cétonique ou un groupe hydroxy ou un reste phényle, alcoylphényle, aralcoylphényle, arylphényle, acylphényle, alcoxyphényle ou halogénophényle ;

B représente un groupe hydrocarboné divalent contenant un à cinq atomes de carbone en chaîne droite ou ramifiée saturée ou éthylénique.

Y représente un atome d'hydrogène ou un reste alcoyle léger.

Z représente une à trois substitutions facultatives pouvant être un ou des restes alcoyle et/ou un ou des restes alcényle et/ou un ou des restes trifluorométhyle et/ou un ou des restes cycloalcoyle et/ou un ou des restes cycloalcényle et/ou un ou des restes aryle et/ou un ou des restes aralcoyle et/ou un ou des restes aralcényle et/ou un ou des halogènes et/ou un ou des groupes alcoxy et/ou un ou des groupes alcoylthio et/ou un ou des groupes aryloxy et/ou un ou des groupes aralcoxy et/ou un ou des groupes arylthio et/ou un ou des groupes aralcoylthio ;

R peut aussi représenter un groupe hydrocarboné divalent $-\text{CH}=\text{CH}-$ $\text{CH}=\text{CH}-$ joignant deux atomes de carbone vicinaux du noyau benzénique de façon à former un naphthalène pouvant lui-même porter une ou deux substitutions ci-dessus énumérées et, lorsque l'une de ces substitutions est un reste cyclohexyle ou cyclohexenyle, celui-ci pouvant porter une fonction hydroxy-ou oxo et/ou un reste alcoyle ou alcényle ;

2°. Produit industriel conforme à la première revendication constitué par la Bis $\text{[} \text{[} (\text{chloro-4 phényl})\text{-2 propionoxy } \text{]-4}$ ditertiobutyl-3,5 phénylthio]-2,2 propene

3°. Produits industriels conformes à la première revendication constitués par les composés suivants :

Bis $\text{[} \text{[} (\text{chloro-4 phénoxy})\text{-2 méthyl-2 propionoxy } \text{]-4}$ ditertiobutyl-3,5 phénylthio]-1,1 propane

Bis $\text{[} \text{[} (\text{chloro-4 phénoxy})\text{-2 méthyl-2 propionoxy } \text{]-4}$ ditertiobutyl-3,5 phénylthio]-1,1 éthane

Bis $\text{[} \text{[} (\text{chloro-4 phénoxy})\text{-2 méthyl-2 propionoxy } \text{]-4}$ ditertiobutyl-3,5 phénylthio]-2,2 butane

Bis $\text{[} \text{[} (\text{chloro-4 phénoxy})\text{-2 méthyl-2 propionoxy } \text{]-4}$ ditertiobu-

- tyl-3,5 phénylthio_7-2,2 hexane
 Bis [] (chloro-4 phénoxy)-2 méthyl-2 propionoxy_7-4 ditertioamyl
 -3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [] (chloro-4 phénoxy)-2 méthyl-2 propionoxy_7-4 méthyl-3 ter
 5 tiobutyl-5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [] (chloro-4 phénoxy)-2 méthyl-2 propionoxy_7-4 isopropyl-3
 tertibutyl-5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [] (chloro-4 phénoxy)-2 méthyl-2 propionoxy_7-4 isopropyl-3
 tertibutyl-5 phénylthio_7-1,1 éthane
 10 Bis [] (chloro-4 phénoxy)-2 méthyl-2 propionoxy_7-4 isopropyl-3
 tertibutyl-5 phénylthio_7-2,2 pentane
 4°. Produits conformes à la première revendication constitués par
 les composés suivants :
 Bis [] (chloro-4 phénoxy)acétoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phényl-
 15 thio_7-2,2 propane
 Bis [] (chloro-4 phénoxy)-2 propionoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5
 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [] (chloro-4 phénoxy)-2 méthyl-2 propionoxy_7-4 ditertiobu-
 tyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 20 Bis [] méthyl-2 (trifluorométhyl-4 phénoxy)-2 propionoxy_7-4 di-
 tertibutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [] (dichloro-2,4 phénoxy)-2 méthyl-2 propionoxy_7-4 diter-
 tiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [] (méthyl-4 phénoxy)-2 méthyl-2 propionoxy_7-4 ditertiobu-
 25 tyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [] (chloro-4 phénoxy)-2 butyroxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phé-
 nylthio_7-2,2 propane
 Bis [] (chloro-4 phénoxy)-2 méthyl-2 butyroxy_7-4 ditertiobutyl-
 3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 30 Bis [] (trifluorométhyl-4 phénoxy)-2 butyroxy_7-4 ditertiobutyl-
 3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [] méthyl-2 (trifluorométhyl-4 phénoxy)-2 butyroxy_7-4 diter-
 tiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [] méthyl-4 phénoxy-4 valérianoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phé-
 35 nylthio_7-2,2 propane
 Bis [] Ethyl-4 phénoxy-4 valérianoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phé-
 nylthio_7-2,2 propane
 Bis [] Diméthyl-2,4 phénoxy-4 valérianoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5
 phénylthio_7-2,2 propane

- anoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [] (trifluorométhyl-4 phénoxy)-4 oxo-3 méthyl-4 valérianoxy_7
 -4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [] (trifluorométhyl-4 phénoxy)-4 oxo-3 méthyl-2 valérianoxy
 5 _7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [] (diméthyl-2,4 phénoxy)-4 hydroxy-3 méthyl-4 valérianoxy_7
 -4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [] (diméthyl-2,4 phénoxy)-4 oxo-3 méthyl-4 valérianoxy_7-4
 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 10 Bis [] (diméthyl-2,4 phénoxy)-4 hydroxy-3 méthyl-2 valérianoxy_7
 -4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [] (diméthyl-2,4 phénoxy)-4 oxo-3 méthyl-2 valérianoxy_7-4
 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [] (méthyl-2 chloro-4 phénoxy)-2 hydroxy-3 méthyl-4 valéri-
 15 anoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [] (méthyl-2 chloro-4 phénoxy)-2 hydroxy-3 méthyl-2 valéri-
 anoxy_7-2,2 propane
 Bis [] (méthyl-2 chloro-4 phénoxy)-2 oxo-3 méthyl-4 valérianoxy
 _7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 20 Bis [] (méthyl-2 chloro-4 phénoxy)-4 oxo-3 méthyl-2 valérianoxy
 _7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 6°. Produits conformes à la première revendication constitués par
 les composés suivants :
 Bis [] a-(méthyl-2 chloro-4 phénoxy) a-(chloro-4 phényl)acétoxy
 25 _7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [] a-(méthyl-2 chloro-4 phénoxy) a-(trifluorométhyl-4 phé-
 nyl) acétoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [] a-(dichloro-2,4 phénoxy) a-(chloro-4 phényl)acétoxy_7-4
 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 30 Bis [] a-(diméthyl-2,4 phénoxy) a-(chloro-4 phényl)acétoxy_7-4
 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [] a-(chloro-4 phénoxy) a-(chloro-4 phényl)acétoxy_7-4 ditér-
 tiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [] a-(diméthoxy-2,4 phénoxy) a-(chloro-4 phényl)acétoxy_7-4
 35 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [] a-(trifluorométhyl-4 phénoxy) a-(chloro-4 phényl)acétoxy
 _7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [] a-(méthyl-2 trifluorométhyl-4 phénoxy) a-(chloro-4 phényl)
 acétoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane

7°. Produits conformes à la première revendication constitués par les composés suivants :

- Bis $\square\square\square$ (cyclohexyl-6 naphthyl-2)oxy-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane
- 5 Bis $\square\square\square$ (hydroxy-3 cyclohexyl)-6 naphthyl-2-7oxy-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane
- Bis $\square\square\square$ (hydroxy-3 méthyl-3 cyclohexyl)-6 naphthyl-2-7oxy-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane
- Bis $\square\square\square$ (hydroxy-3 cyclohexène-1 yl)-6 naphthyl-2-7oxy-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane
- 10 Bis $\square\square\square$ (hydroxy-3 éthyl-3 cyclohexyl)-6 naphthyl-2-7oxy-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane
- Bis $\square\square\square$ (hydroxy-3 vinyl-3 cyclohexyl)-6 naphthyl-2-7oxy-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane
- 15 Bis $\square\square\square$ (cyclohexyl-6 naphthyl-2)oxyacétoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane
- Bis $\square\square\square$ (oxo-3 cyclohexyl-6)naphthyl-2-7oxyacétoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane
- Bis $\square\square\square$ (oxo-3 cyclohexyl)-6 naphthyl-2-7oxy-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane
- 20 Bis $\square\square\square$ (oxo-3 cyclohexène-1 yl)-6 naphthyl-2-7oxyacétoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane
- Bis $\square\square\square$ (oxo-3 cyclohexène-1 yl)-6 naphthyl-2-7oxy-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane
- 25 8°. Produit industriel conforme à la première revendication constitué par le Bis $\square\square\square$ (tétraliny-1)-4 phénoxy-7-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane.
- 9°. Produits conformes à la première revendication constitués par les composés suivants :
- 30 Bis $\square\square\square$ (tétraliny-1)-4 phénoxy-7-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-1,1 propane
- Bis $\square\square\square$ (tétraliny-1)-4 phénoxy-7-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-1,1 éthane
- Bis $\square\square\square$ (tétraliny-1)-4 phénoxy-7-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 butane
- 35 Bis $\square\square\square$ (tétraliny-1)-4 phénoxy-7-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 hexane
- Bis $\square\square\square$ (tétraliny-1)-4 phénoxy-7-2 méthyl-2 propionoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane

- Bis [[(tétraliny1-1)-4 phénoxy_7-2 méthyl-2 propionoxy_7-4
méthyl-3 tertio-butyl-5 phénylthio_7-2,2 propane
- Bis [[(tétraliny1-1)-4 phénoxy_7-2 méthyl-2 propionoxy_7-4
isopropyl-3 tertio-butyl-5 phénylthio_7-2,2 propane
- 5 Bis [[(tétraliny1-1)-4 phénoxy_7-2 méthyl-2 propionoxy_7-4
isopropyl-3 tertio-butyl-5 phénylthio_7-1,1 éthane
- Bis [[(tétraliny1-1)-4 phénoxy_7-2 méthyl-2 propionoxy_7-4
isopropyl-3 tertio-butyl-5 phénylthio_7-2,2 pentane
- 10°. Produits conformes à la première revendication constitués
- 10 par les composés suivants :
- Bis [[(tétraliny1-1)-4 phénoxyacétoxy_7-4 ditertio-butyl-3,5
phénylthio_7-1,1 propane
- Bis [[(tétraliny1-1)-4 phénoxy_7-2 propionoxy_7-4 ditertio-butyl-3,5
phénylthio_7-1,1 propane
- 15 Bis [[(tétraliny1-1)-4 phénoxy_7-2 méthyl-2 propionoxy_7-4
ditertio-butyl-3,5 phénylthio_7-1,1 propane
- Bis [[(tétraliny1-1)-4 phénoxy_7-2 éthyl-2 propionoxy_7-4 di-
tertio-butyl-3,5 phénylthio_7-1,1 propane
- Bis [[(tétraliny1-1)-4 phénoxy_7-2 éthyl-2 butyroxy_7-4 di-
tertio-butyl-3,5 phénylthio_7-1,1 propane
- 20 Bis [[(tétraliny1-1)-4 phénoxy_7-2 butyroxy_7-4 ditertio-butyl-3,5
phénylthio_7-1,1 propane
- Bis [[(tétraliny1-1)-4 phénoxy_7-5 valérianoxy_7-4 ditertio-butyl-3,5
phénylthio_7-1,1 propane
- 25 Bis [[(tétraliny1-1)-4 phénoxy_7-2 valérianoxy_7-4 ditertio-butyl-3,5
phénylthio_7-1,1 propane
- Bis [[(tétraliny1-1)-4 phénoxy_7-2 acryloxy_7-4 ditertio-butyl-3,5
phénylthio_7-1,1 propane
- 11°. Produit industriel conforme à la première revendication
- 30 constitué par la Bis [[(méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 méthyl-2
propionoxy_7-4 ditertio-butyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- 12°. Produits industriels conformes à la première revendication constitués par les composés suivants :
- Bis [[(méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 méthyl-2 propionoxy_7-4
ditertio-butyl-3,5 phénylthio_7-1,1 propane
- 35 Bis [[(méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 méthyl-2 propionoxy_7-4
ditertio-butyl-3,5 phénylthio_7-1,1 éthane
- Bis [[(méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 méthyl-2 propionoxy_7-4
ditertio-butyl-3,5 phénylthio_7-2,2 butane

- Bis [] (méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 méthyl-2 propionoxy_7-4
ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 hexane
Bis [] (méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 méthyl-2 propionoxy_7-4
ditertioamyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- 5 Bis [] (méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 méthyl-2 propionoxy_7-4
méthyl-3 tertibutyl-5 phénylthio_7-2,2 propane
Bis [] (méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 méthyl-2 propionoxy_7-4
isopropyl-3 tertibutyl-5 phénylthio_7-2,2 propane
Bis [] (méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 méthyl-2 propionoxy_7-4
- 10 isopropyl-3 tertibutyl-5 phénylthio_7-1,1 éthane
Bis [] (méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 méthyl-2 propionoxy_7-4
isopropyl-3 tertibutyl-5 phénylthio_7-2,2 pentane
13°. Produits industriels conformes à la première revendication
constitués par les composés suivants :
- 15 Bis [] (benzofuranne-5)oxy-2 acétoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phé-
nylthio_7-2,2 propane
Bis [] (benzofuranne-5)oxy-2 propionoxy_7-4 ditertiobutyl-3,5
phénylthio_7-2,2 propane
Bis [] (benzofuranne-5)oxy-2 méthyl-2 propionoxy_7-4 ditertio-
butyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- 20 Bis [] (benzofuranne-5)oxy-2 éthyl-2 propionoxy_7-4 ditertiobu-
tyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
Bis [] (benzofuranne-5)oxy-2 éthyl-2 butyroxy_7-4 ditertiobutyl
-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- 25 Bis [] (benzofuranne-5)oxy-2 méthyl-2 butyroxy_7-4 ditertiobutyl
-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
Bis [] (benzofuranne-5)oxy-2 butyroxy_7-4 ditertiobutyl-3,5
phénylthio_7-2,2 propane
Bis [] (benzofuranne-5)oxy-4 butyroxy_7-4 ditertiobutyl-3,5 phé-
nylthio_7-2,2 propane
- 30 Bis [] (méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 éthyl-2 propionoxy_7-4 di-
tertibutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
Bis [] (méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 éthyl-2 butyroxy_7-4 di-
tertibutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
- 35 Bis [] (méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 acétoxy_7-4 ditertiobutyl
-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
Bis [] (méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 propionoxy_7-4 ditertio-
butyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
Bis [] (méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 butyroxy_7-4 ditertiobu-

- tyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [] (méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-4 butyroxy_7-4 ditertiobutyl
 -3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [] (méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 valérianoxy_7-4 ditertio-
 5 butyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [] (méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-3 propionoxy_7-4 ditertio-
 butyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [] (méthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 acryloyloxy_7-4 ditertio-
 butyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 10 Bis [] (éthyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 méthyl-2 propionoxy_7-4 di-
 tertibutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [] (isopropyl-2' benzofuranne-5)oxy-2 acétoxy_7-4 ditertio-
 butyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 Bis [] (isopropyl-2 benzofuranne-5)oxy-2 méthyl-2 propionoxy_7
 15 -4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio_7-2,2 propane
 14°. Produit industriel conforme à la première revendication
 constitué par le Bis (nicotinoyl-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio)-
 2,2 propane
 15°. Produits industriels conformes à la première revendication
 20 constitués par les composés suivants :
 Bis (nicotinoyloxy-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio)-1,1 propane
 Bis (nicotinoyloxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio)-1,1 éthane
 Bis(nicotinoyloxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio)-2,2 butane
 Bis(nicotinoyloxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio)-2,2 hexane
 25 Bis(nicotinoyloxy)-4 ditertioamyl-3,5 phénylthio)-2,2 propane
 Bis(nicotinoyloxy)-4 méthyl-3 tertibutyl-5 phénylthio)-2,2 pro-
 pane
 Bis(nicotinoyloxy)-4 isopropyl-3 tertibutyl-5 phénylthio)-2,2
 propane
 30 Bis(nicotinoyloxy)-4 isopropyl-3 tertibutyl-5 phénylthio)-1,1
 éthane
 Bis(nicotinoyloxy)-4 isopropyl-3 tertibutyl-5 phénylthio)-2,2
 pentane
 16°. Produits industriels conformes à la première revendication
 35 constitués par les composés suivants :
 Bis(N-oxynicotinoyloxy-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio)-2,2 pro-
 pane
 Bis(nicotinoyloxy-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio)-1,1 propane
 Bis(N-oxynicotinoyloxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio)-1,1

éthane

Bis(N-oxynicotinoyloxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio)-2,2 butane

Bis(N-oxynicotinoyloxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio)-2,2 hexane

5 Bis(N-oxynicotinoyloxy)-4 ditertioamyl-3,5 phénylthio)-2,2 propane

Bis(N-oxynicotinoyloxy)-4 méthyl-3 tertibutyl-5 phénylthio)-2,2 propane

10 Bis(N-oxynicotinoyloxy)-4 isopropyl-3 tertibutyl-5 phénylthio)-2,2 propane

Bis(N-oxynicotinoyloxy)-4 isopropyl-3 tertibutyl-5 phénylthio)-1,1 éthane

Bis(N-oxynicotinoyloxy)-4 isopropyl-3 tertibutyl-5 phénylthio)-2,2 pentane

15 17°. Produit industriel conforme à la première revendication constitué par le Bis $\overline{\text{L}}$ (thiazole-5 carboxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio $\overline{\text{J}}$ -2,2 propane

18°. Produits industriels conformes à la première revendication constitués par les composés suivants :

20 Bis $\overline{\text{L}}$ (thiazole-5 carboxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio $\overline{\text{J}}$ -1,1 propane

Bis $\overline{\text{L}}$ (thiazole-5 carboxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio $\overline{\text{J}}$ -1,1 éthane

Bis $\overline{\text{L}}$ (thiazole-5 carboxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio $\overline{\text{J}}$ -2,2

25 butane

Bis $\overline{\text{L}}$ (thiazole-5 carboxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio $\overline{\text{J}}$ -2,2

hexane

Bis $\overline{\text{L}}$ (thiazole-5 carboxy)-4 ditertioamyl-3,5 phénylthio $\overline{\text{J}}$ -2,2 propane

30 Bis $\overline{\text{L}}$ (thiazole-5 carboxy)-4 méthyl-3 tertibutyl-5 phénylthio $\overline{\text{J}}$ -2,2 propane


Bis $\overline{\text{L}}$ (thiazole-5 carboxy)-4 isopropyl-3 tertibutyl-5 phénylthio $\overline{\text{J}}$ -1,1 éthane

Bis $\overline{\text{L}}$ (thiazole-5 carboxy)-4 isopropyl-3 tertibutyl-5 phénylthio

35 $\overline{\text{J}}$ -2,2 pentane

19°. Procédé de fabrication consistant dans l'action d'un halogénure ou d'un anhydride dérivé d'un acide de formule générale X-COOH , X étant comme il est dit dans la première revendication, sur un bis (hydroxy-4 phénylthio)alcane défini par la formule

générale VII suivante :



dans laquelle R', R'', R''', et R''' sont comme il est dit dans la première revendication.

- 10 20°. Procédé conforme à la revendication 19 caractérisé par le. présente dans le milieu réactionnel d'une base minérale ou d'une amine tertiaire ou d'un hétérocycle azoté tertiaire.
- 21°. Procédé conforme à la revendication 19 caractérisé par l'emploi d'un dérivé O-métallique du bis (hydroxy-4 phénylthio) al-
- 15 cane de formule VII.

